

МАКЕДОНСКИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

СПИСАНИЕ НА МАКЕДОНСКОТО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО



МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
ЗДРУЖЕНИЕ НА ПСИХИЈАТРИТЕ НА РМ

MACEDONIAN MEDICAL ASSOCIATION
ASSOCIATION OF PSYCHIATRISTS OF MACEDONIA

II КОНГРЕС НА ПСИХИЈАТРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

II CONGRESS OF PSYCHIATRISTS OF R. MACEDONIA
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION



ЗБОРНИК НА АПСТРАКТИ BOOK OF ABSTRACTS

Охрид, 07-10 Јуни 2000
Ohrid, 07-10 June 2000

Мак мед преглед	54 (Суспектмент) 42	Стр. 1-93	Скопје	2000
-----------------	---------------------	-----------	--------	------

042 ДИЈАГНОСТИЧКИ АСПЕКТИ НА ШИЗОАФЕКТИВНО ПОРЕМЕТУВАЊЕ

Филов И.

Психијатрска болница - Демир Хисар

Цел на трудот шизоафективното пореметување е се уште нозолошки неодредено, со нејасни содржини и граници. Поради се почестото разврстување на пациентите од шизофрениот круг во шизоафективното пореметување, анализата на дијагностичираните случаји под дијагноза Ф 25.0, во Психијатриската болница Демир Хисар има за цел потврдување на воспоставените дијагностички критериуми или евентуално, некои нови согледувања, кои односот на шизоафективното пореметување кон шизофренија или Афективните растројства, би го претставиле во ново светло.

Материјали и методи Анализата во овој материјал опфаќа период од последните пет години. Користени се истории на болести на пациенти, кои се испишани под Дг. шизоафективно пореметување и при тоа како параметри за анализа, земени се: возраст, пол, заминање, манифестирала, генетска предиспозиција, број на хоспитализации, семеен статус; шизофрени аспект на клиничката слика и анализа на афективитетот.

Резултати и заклучоци 1. Поради полиморфизмот на клиничката слика, често е можно погрешно разврстување на вистинските афективни пореметувања во шизоафективното пореметување.

2. Следејќи го клиничкиот тек на болеста, кој најчесто се карактеризира со голем број на хоспитализации се доаѓа до заклучок дека еден значителен број случаи се регрутира од шизофрениот круг.

3. Клиничкиот тек се карактеризира со периодицитет, а периодите на ремисија со адекватно социопрофесионално функционирање.

DIAGNOSTIC ASPECTS OF SHIZOAFFECTIVE DISORDER

Izabela Filov

Psychiatrist hospital - Demir Hisar

Schizoaffective disorder is still insufficiently delineate, with still undefined contents.

Because of the more frequently usage of this disorder (from the new classification as F 25), the purpose of this paper is confirm the established diagnostics criterias or to comprehend same news, which will eventually approach and explicate the relation between shizoaffective disorder with schizophrenia and affective disorders.

We have used the material from the last three years; history illness from the patients which were deduced with Dg F25.0

Results shows polymorphous clinical course, possibilities for mistake, periodic clinical course - without any specific rules.

043 ИНТЕНЗИВЕН ТРЕТМАН ПРИ АКУТНИ ВИОЛЕНТНИ ПСИХОТИЧНИ ПАЦИЕНТИ

Нешићи И., Чадиковски Б., Кировски П.,
Наумов Ј., Станиковска Г., Дуковска В.
Психијатрска болница Скопје

Резиме: Агресијата и виолентното однесување тесно се поврзани со акутните психотични симтоми. Тие се дел било на акутниот или хроничниот психотичен феномен. Во основа во синдромот на психомоторен немир лежи виолентното и агресивното однесување кое достигнува ниво на психотичност. Дезорганизацијата на менталното функционирање се карактеризира со немир, дисконтрола на однесувањето, афективно пореметување со страв, анксиозност, бес, нагласен моторен аганжман, а во некој случај пореметување на свеста и патолошка когниција (параноидни содржини).

Психотичните виолентни пациенти се сместуваат во единиците за интензивен третман при менталните болници. Вниманието е свртено кон брзата седација и танквилизација со разни дози на невролептична терапија со намалување на психомоторниот немир и деструктивното однесување. Воедно невролептиците ги модифицираат и редуцираат симтомите на психотичното пореметување. Полизирање на психомоторниот немир се оди кон прилагодување на дозата на невролептици, брзо преоѓање кон перорална терапија и воведување на сите други тераписки техники во