

МАКЕДОНСКИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД
СПИСАНИЕ НА МАКЕДОНСКОТО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО



КНИГА НА АНСТРАКТИ ABSTRACT BOOK

IV Македонски психијатрички конгрес
со меѓународно учество

*IV Macedonian Psychiatric Congress
and International Meeting*

Охрид, 27-31 мај 2009
Ohrid, 27-31 May 2009

P-164

ФРЕКВЕНЦИЈА НА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КАЈ СХИЗОФРЕНИ ПАЦИЕНТИ ТРЕТИРАНИ СО АТИПИЧНИ НЕВРОЛЕПТИВИ

Најдовска С., Филов И., Кузмановски Л.,
Стојческа Н.

Психијатриска болница Демир Хисар

Вовед: Од повеќе студии во литературата дојдено е до заклучок дека експресијата на тип 2 дијабетес мелитус е поголема кај пациенти третирани со атипични невролептици, отколку кај нормална популација.

Материјал и метод: Заради потврда на горенаведената теза направено е истражување во ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар кај 45 пациенти, кај кои според МКБ 10 е дијагностицирана шизофренија. Од нив 30 се третирани со Рисперидон, 15 со Клозапин. Во период од приемот во наредните две години анализирани се вредностите се вредностите на гликемијата на секои три месеци.

Резултати: При приемот гликемијата беше во нормални граници. Ви текот на двете години под невроплетичка терапија се развија промени во гликемијата во вредности од 7-11 ммол/л, кај девет пациенти, од нив три на Клозапин и шест на Рисперидон. Исто така имаше и варијации во телесната тежина.

Заклучок: Третманот со атипични веролептици дава метаболни промени во регулацијата на гликемијата во крвта, како и промени во Body mass index.

P-165

НАШЕ КЛИНИЧКО ИСКУСТВО СО РИСПОЛЕПТ КОНСТА ВО ТРЕТМАНОТ НА ПОСТАРИ ПАЦИЕНТИ

Никушева М., Роза К., Идриз Н.
Психијатриска болница "Скопје"- Скопје

Цел: Прикажано е нашето клиничко искуство во ефективноста и сигурноста на Рисполент Конста во третманот на постари пациенти со индикација за депо терапија.

Материјал и Методи: Рисполент Конста беше аплициран кај 8 пациенти со возраст над 65 години, со дијагноза Нерзистентно најудничаво растројство кај 5 пациенти и 3 со Шизофрено растројство, хоспитализирани на Одделот за психогеријатрија во текот на последната година. Претходно пациентите имале повеќекратни хоспитализации, ја прекипувале пер ос-терапијата релативно брзо после исписите и кај сите пациенти било присутно агресивно однесување пред

хоспитализацијата. По поставување на индикација за депо препарат беше аплицирано Рисполент Конста од 25 мг. на 3 недели, според протоколот за дозирање и апликација.

Резултати: Анализата покажа задржување на добра психичка состојба кај 7 од 8 пациенти. Еден пациент после 3 месеци имаше влошување на психичката состојба со психотичност и рехоспитализација. Другите 7 пациенти се во добра психичка состојба, без рехоспитализација, со добар квалитет на живот.

Дискусија: Рисполентот Конста беше добро толериран и не беше асоциран со посеризни несакани ефекти. Не се регистрираше промена на когнитивниот статус. За жал 3 пациенти веќе ја прекинаа дело терапијата заради финансиски причини. Како и да е потребни се понатамошни клинички искуства.

P-166

НЕСАКАНИ ДИСТОНИЧНИ СИМТОМИ КАЈ НЕВРОЛЕПТИЧНА ТЕРАПИЈА КАЈ ПАЦИЕНТ СО ПАРАНОИДНА ШИЗОФРЕНИЈА

Степаноска Ј., Стефановски Б., Стојчевска Н.,
Ристевска Г., Алачка Д.
Клиника за психијатрија - Скопје

Појавата на екстрапирамидална симтоматологија кај пациенти кои се лекувани со антипсихотици од првата генерација е многу честа а се манифестира почесто со тремор, ригор како тардитивна дискинезија а поретко како дистонија. Пациентка на 62 годишна возраст која 30 години наназад боледува од параноидна шизофренија, која прв пат е хоспитализирана 1991 година. Пациентката повеќе од 15 години континуирано е лекувана со fluphenazine во орална и депо форма терапија која во 2007 год. поради појава на екстрапирамидални симтоми нагло е прекината и замената со атипичен антипсихотик olanzapine. По оваа промена се јавува дистонија со манифестирање на: дистонија, несинхронизирана контракција на паравертебралната мускулатура, опистотонусно држење на телото, дискинетични движења на долните екстремитети, атаксичен од поради моторната дисинхронизација поради што е остварена и третата хоспитализација. Вратена е на ниски дози на fluphenazine, потоа на clozapine, amytriptyline, антихолинергик - biperidin и amatadine sulfate по што кај пациентката се регистрираше делумна редукција на дистонијата. Пациентката редовно амбулански е контролирана по што се регистрира редукција на параноидната симтоматологија но без подобрување на дистонијата, пациентката е резистентна на секоја терапија која би ја ублажила дистонијата.