

МАКЕДОНСКИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД
СПИСАНИЕ НА МАКЕДОНСКОТО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО



КНИГА НА АПСТРАКТИ ABSTRACT BOOK

IV Македонски психијатрички конгрес
со меѓународно учество

IV Macedonian Psychiatric Congress
and International Meeting

Охрид, 27-31 мај 2009

Ohrid, 27-31 May 2009

P-212

WITHDRAWAL SYNDROME FOLLOWING DISCONTINUATION OF BENZODIAZEPINE ABUSE

Stojcheska N., Ristevska G., Stepanoska J., Filov I., Manusheva N., Stefanovski B.
IZU Psihijatrica bolnica, Demir Hisar
IZU Univerzitetska klinika za psihijatrija, Skopje

This is a case-report of 49 years old patient with social phobia and chronic use and dependence of benzodiazepine. Long-term use of benzodiazepine caused the development of tolerance and dependence. In the last four years he used benzodiazepine in dosage of 120 mg/day, because of the persistence of symptoms of physical dependence, anxiety, insomnia, depressive mood, headache, poor memory and concentration and psychomotor retardation. Hospital treatment was started with antidepressant and antipsychotic at low dosage. The benzodiazepine was discontinued abruptly, and day after discontinuation we registered rebound symptoms like anxiety, insomnia. At the third day started developing of withdrawal syndrome: anxiety, excitability, poor concentration, insomnia, depression, hand tremor, palpitation, diarrhoea, sweating, stiffness, dry mouth, speech difficulties. Maximal intensivity and severeness of the symptoms were registered on the sixth day: irritability, agitation and confusion. Benzodiazepine was introduced again which was followed with period of slow reducing the dose for six weeks with less severe withdrawal symptoms and permanent use of antidepressant. The treatment was continued in daily hospital. Conclusion: When we have a patient with benzodiazepine misuse and abuse we should discontinue the drug very slowly and with use of appropriate psychopharmacotherapy.

P-213

УПОТРЕБА НА ДРУТИ СУПСТАНЦИИ КАЈ ПАЦИЕНТИ ВКЛУЧЕНИ НА МЕТАДОНСКИ ПРОГРАМ ВО СПТЗД ШТИП

Стојменова М., Панева В.

Служба за превенција и третман на злоупотреба на дрога - ЈЗУ Општа болница Штип

Вовед: Зависноста е современа болест која зема се поголем замав. Еден начин за намалување на штетите е програмата на одржување со метадон. Но и покрај вклученоста на терапија на одржување со метадон, зависниците често посегнуваат и по други психоактивни супстанции.

Цел: на ова истражување е да се определи застапеноста на употребата на на други супстанции кај лицата вклучени на метадонски програм.

Материјал и методи: Истражувањето е спроведено на примерок од 39 испитаници на возраст од 20 до

38 години. Од испитаниците 37 се мажи а 2 се жени вклучени на метадонска терапија на одржување. Податоците се добиени со користење на нестандартизиран прашалник и бриз тестови за отдавање на присуство на ПАС во урината. Испитувана е употребата на цигари, алкохол, марихуана, бензодиазепини и хероин. **Резултати:** Во текот на третманот на одржување со метадон, 39 од испитаниците пушат цигари, алкохол конзумираат 19, 17 користат марихуана, 33 употребуваат бензодиазепини и 14 земаат хероин. **Заклучок:** Од спроведеното истражување може да се заклучи дека употребата на други ПАС кај пациентите на метадонски програм е изразена во голем процент.

P-214

ЕФИКАСНОСТА НА SEROXAT ВО ТРЕТМАНОТ НА ДЕПРЕСИВНАТА СИМПТОМАТОЛОГИЈА ВО РАНИОТ ПОСТДЕТОКСИКАЦИОННИ ПЕРИОД

Суботин-Поповска О., Савеска М.; Сапсовска-Трајановска А; Владимирова М; Арсова Р.*; Пачоска Н

ЈЗУ Psihijatrica болница Скопје

*Центар за превенција и третман на зависници од дроги Штип

Вовед: Детоксикацијата како метод на третман на опијатната зависност е следен со висок степен на рецидивност. Раниот период на апстиненција после извршената детоксикација е проследен со намалување на нивото биогените амиини во плазмата, манифестирано најчесто со појава на нарушувања на афективен план како депресија, дисфорија и анксиозност.

Цел: на оваа студија е да се согледа ефикасноста од употребата на антидепресивите од групата на SSRI (Seroxat) во постдетоксикациониот период односно во редуцирањето на депресивната симптоматологија и стабилизирање на апстиненцијата односно превенирање на рецидивот.

Материјал и методи: Во студијата беа вклучени 32 зависници (28 мажи и 4 жени) од хероин по претходно разрешен апстиненцијален синдром со симптоматска детоксикациона терапија што беше потврдено со направените токсиколошки тестови на урина на денот на вклучување во студијата. Првата група ја сочинуваа 16 пациенти (13 мажи и 3 жени) кои беа третирани со Seroxat во дози од 20-30 mg/дневно, додека втората група ја сочинуваа 16 пациенти (15 мажи и 1 жена) кои беа поставени на плацебо. Сите пациенти беа следени во период од 4 недели со исследувања кои опфаќаа токсиколошка анализа на урина како и Бековата скала за депресија (Beck Depression Inventory)