

muisC-15


MALTEPE UNIVERSITY
INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS



TRANSCULTURAL NURSING




maltepe university publications



Riste Filipov

University "St. Kliment Ohridski" High Medical School,
Bitola, Macedonia

Universitesi "St. Kliment Ohridski", R. Yüksek Tıp Fakültesi
Bitola, Makedonya



Izabela Filov

University "St. Kliment Ohridski" High Medical School,
Bitola, Macedonia

Universitesi "St. Kliment Ohridski", R. Yüksek Tıp Fakültesi
Bitola, Makedonya

Analysis of “suicide” attempts in the southwest region of the Republic of Macedonia

Makedonya Cumhuriyeti'nin güneybatı bölgelerinde intihar teşebbüslerinin analizi

Introduction: The modern living with its challenges is connected with a depressive experience of the everyday difficulties, and therefore with a higher suicide rate.

Aim: The aim of our research was to acquire information and to analyze the suicide attempts in the Ohrid region. The analysis has been conducted with

Giriş: Modern yaşam ve zorlukları, depreşif bir deneyimle birleştiğinde intihar vakaları yükselmektedir.

Amaç: Bu araştırmanın amacı Ohrid Bölgesinde intihar teşebbüsü vakalarını analiz etmek ve bilgi edinmektir. Analiz cinsiyet, yaş, ulus, bölge, girişimin sebepleri, sabıkalı sayısı ve onların bir hastanede polis eşliğinde kayıtları alınıp alınmadığı gibi paramet-

these parameters: sex, age, nationality, location, reasons for the attempt, number of recidivists and if they are registered in the police beside in the hospitals. Other important aim was to use the obtained results as an incentive for conducting different, advanced, educational, adequate and specialized programs with psychological aspect for the medical students and medical officers for preventing suicides on the field using different psychological techniques and methods.

Methods: A research about the suicide attempts in the last 5 years in the southwest region of the Republic of Macedonia has been conducted through acquiring competent and relevant analytical data from the Police in Ohrid and the hospitals where the suicide attempts are registered.

Results: From the research, the conversations with the competent people in the police and hospitals as well as from the acquired analytical data, the following is concluded: - The percentage of registered patients for suicide attempts in Ohrid, Struga and Kichevo for the mentioned period is:

The highest percent of suicide attempts is in Ohrid 86%, by sex 59% are women, by age 88% are adults, by nationality 81,5% are Macedonian,

reler üzerine kurulmuştur. Diğer önemli bir amaçta intiharın altında yatan sebeplerin bulunarak psikolojik olarak farklı teknik ve metodlar bulmaktadır.

Yöntem: Son beş yılda Ohrid Bölgesinde polisten ve hastanelerden alınan bilgilere dayanılarak bu araştırma gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya göre hastanelerde yapılan görüşmeler ve polisten alınan bilgiler ışığında şu sonuçlar çıkmıştır: Ohrid, Struga, Kichevo'da hastaneye ya da polise başvuran intihar teşebbüslerinin oranları şöyledir: En yüksek oran %86'yla Ohrid'dedir. Bu teşebbüslerin %86'sı kadın, yaş itibarıyle %88'i yetişkin, millet olarak %81,5'i Makedon, yer olarak %77 evde, sebep olarak %46'sı sınırlarının zayıflaması ve %17'si ise sabıkaldır. Bütün teşebbüsler poliste kayıtlıdır ve gerekli sağlık hizmeti de verilmiştir.

Sonuç: Sonuçlara göre 76 kişiden 9'u reşit değildir, 13'ü sabıkaldır ve hala intihar niyeti bulunmaktadır. Tip öğrencilerinin ve memurlarının psikologlar tarafından eğitilmeleri gerekmektedir. İntihar eğilimi olan hastalardaki risk faktörlerini bilmeleri, reşit olmayan ya da sabıkalıların intihar teşebbüslerini engellemeyi öğrenmek üzere eğitimlileri gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: İntihar, sosyodemografik riskler, önlem

by location 77% of the attempts are in houses, 46% are due to neurasthenia, and 17% are recidivists. All attempts are registered in the police and hospitals where adequate medical help is offered to the patients.

Conclusion: According to the results, it is noted that out of the total number of 76 people, 9 are minors who due to certain reasons had a suicide attempt, and 13 are recidivists who still have the intention for suicide.

It is necessary for the medical students and medical officers to be educated by psychologists and to improve the knowledge and skills in the area of recognizing the risk factors with patients who due to psychological or other problems attempt suicide, with a special accent to prevention of those occurrences with minors and recidivists.

Key words: Suicides, sociodemographic risks, prevention