

МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
ЗДРУЖЕНИЕ НА ГИНЕКОЛОЗИ И ОПСТЕТРИЧАРИ



MACEDONIAN MEDICAL SOCIETY
ASSOCIATION OF GYNAECOLOGISTS AND OBSTETRICIANS



I КОНГРЕС
НА ГИНЕКОЛОЗИТЕ И ОПСТЕТРИЧАРИТЕ
ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

FIRST CONGRESS
OF GYNAECOLOGISTS AND OBSTETRICIANS
OF REPUBLIC OF MACEDONIA

ЗБОРНИК НА АПСТРАКТИ
BOOK OF ABSTRACTS

25 - 27.10.1998, Скопје, Република Македонија

25 - 27.10.1998, Skopje, Republic of Macedonia

FRACTIONIRANA EXPLORATIVNA КИРЕТАЖА КАКО ДИЈАГНОСТИЧКА МЕТОДА ПРИ КРВАРЕЊА КАЈ ЖЕНИ НАД 40 ГОДИНИ

Капетаноска М., Б.Котески, Е. Јашовиќ

Цел. Морфолошка слика на крварења кај пациентки над 40 години и нивна хистопатолошка диференцијација со fractionirana explorativna киретажа.

Материјал и методи: Обработени се 47 пациентки со продолжени обилни или ирегуларни крварења од утерус, кај кои во дијагностичка цел е направена fractionirana explorativna киретажа и добиениот материјал хистопатолошки анализиран.

Резултати: Од 47 пациентки 68,1% беа со recidivantna менометрорхагија, 21,3% со крварење во постменопауза а 10,6% со cervikalen polyp. Хистопатолошкиот обработениот материјал беше:

1. Од 32 пациентки со менометрорхагија recidivans 87,5% има glandularna hyperplasia; 6,25% продолжена фоликуларна фаза; 6,25% endometrialen polyp.
2. Од 10 пациентки со крварење во постменопауза 40% има cysticna glandularna hyperplasia; 40% adenocarcinom, и 20% senilen endometritis.
3. Кај 5 пациентки со cervikalen polyp ХПДг беше polypus c. cervicalis.

Заклучок: Може да се заклучи дека fractioniranata explorativna киретажа кај жени со крварења над 40 год. е корисна метода во поставување на конечна дијагноза, заради понатамошен третман на овие пациентки.