



МАКЕДОНСКИ МЕДИЦИНСКИ
ПРЕГЛЕД

СПИСАНИЕ НА МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

ЗБОРНИК НА РЕЗИМЕА BOOKS OF ABSTRACTS

3

КОНГРЕС ПО ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА
СЪ МЕГУНАРОДНО УЧАСТИЕ

MACEDONIAN CONGRESS OF PREVENTIVE MEDICINE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

04 - 07 ОКТОМВРИ, 2006
ОХРИД, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

04 - 07 OCTOBER, 2006
OHRID, REPUBLIC OF MACEDONIA

Мак мед преглед

60: (Суплемент 68)

Стр: 1 - 204

Скопје, 2006

Приказ на извршената вакцинација и ревакцинација во Прилеп во периодот 2001-2005 година. Материјал и методи: Користени се податоци од годишните извештаи за задолжителна имунизација. Во ретроспективна студија направена е анализа на опфатот со извршена вакцинација и ревакцинација. Резултати: Примарната вакцинација со ОПВ и Ди-Те-Пер вакцина со најнизок опфат (94,6% со ОПВ, 94,1% со Ди-Те-Пер вакцина) е извршена во 2005 година, а со највисок опфат (98,4%) во 2002 година. Ревакцинацијата со двете вакцини е со опфат поголем од 98%. Највисок опфат има во 2002 година (99,2% со Ди-Те-Пер, 99,3% со ОПВ). Ревакцинацијата со Ди-Те вакцина со најнизок опфат (90,8%) е во 2005 година, а во останатите години опфатот е над 98%. Вакцинацијата со МРП вакцина со најнизок опфат (94,1%) е извршена во 2005 година, а со највисок (97,6%) во 2004 година. Ревакцинацијата со истата вакцина со најнизок опфат (97,1%) е извршена во 2002 година. Ревакцинацијата со Те вакцина со најнизок опфат (93,4%) е извршена во 2002 година, а со највисок (97,3%) во 2003 година. Ревакцинацијата со рубеола вакцина со најнизок опфат (93,7%) е извршена во 2002 година, додека највисок опфат (98,5%) има во 2004 година. Заклучок: Примарната вакцинација и ревакцинација со ОПВ и Ди-те-Пер вакцина, вакцинацијата со МРП и ревакцинацијата со Ди-Те вакцина со најнизок опфат се во 2005 година. Најнизок опфат на извршена ревакцинација со МРП, Те и рубеола вакцина има во 2002 година.

Сесија 4 / Session 4 (356-371)

ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ VIRAL HEPATITIS

Постер презентација / Poster presentation

356

ХЕПАТИТ Б ИНФЕКЦИЈА - АКУТУЕЛЕН ПРОБЛЕМ HEPATITIS B INFECTION WITH HEPATITIS B - AN EXISTENT PROBLEM

Бачагозова Г. 1, Камцева М., Сискова Гайдардзиска Д.1,
1 Општа болница - Штип, Република Македонија,

Цел: Актуелноста на хепатит Б инфекцијата како здравствен и тераписки проблем. Материјал и методи: Клинички, епидемиолошки, лабораториски и серолошки испитувања на ХБсАг, антиХБцИгМ, ХБеАг. Резултати: Анализирани се 123 пациенти лекувани на Инфективно-патолошко отделение во периодот 2004-2005 година. Со акутна Б инфекција во овој период се регистрирани 48 пациенти (39%), од кои во 2004 година се 28 пациенти, а во 2005 година 20 пациенти. Машкиот пол во однос на женскиот пол е 2:1. Најзастанена е возраста од 20 до 29 години со 27% и 30-39 години со 25%. Со хронична Б инфекција се регистрирани 35 пациенти (28,4%). Во 2004 година се 16, а во 2005 година се 19 пациенти. Машки пол се 30, а жени се 5. Повторно најзастанени се возрастите од 20 до 29 години и 30-39 години (26%). Здрави носители на ХБсАг се регистрирани 40 (32,5%), од кои 19 се мажи, а 19 се од женски пол и 62,5% од нив се во возраст од 18 до 30 години. Регистрирани се и два случаја - еден на двегодишна и еден на тригодишна возраст со ХБсАг позитивитет. Заклучок: Главен проблем е вирусната инфекција на хронично и асимптоматско постоење на ХБсАг кај млади возрастни лица. Презентацијата со рекомбинантна ЕНГЕРИЦ - вакцина кај ризици групи особено деца родени од ХБсАг позитивни родители, наркозависници, членови на фамилија, како и примената на универзална имунизација кај сите новорождени е главна цел за ерадикација на Б вирусот. Сигурно е актуелна примената на современи препарати - интерферон алфа-2а кај хроничните инфекции за превенција на цироза и хепатоцелуларен карцином.

357

ЗАСТАПЕНОСТ НА ЦИРОЗАТА НА ЦРН ДРОБ И ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ КАЈ ИНФИЦИРАНИ ЛИЦА СО ХЕПАТИТ Б И Ц ВИРУСИ LIVER CIRRHOSIS AND CHRONIC HEPATITIS WITH PERSONS INFECTED WITH VIRUSES OF HEPATITIS B AND HEPATITIS C

Stoilov M. 1, Vasilevski B. 1, Prodanovska-Stojcevska V. 2,
1 Клиничка болница - Битола, 2 Висока медицинска школа - Битола, Република Македонија,

Цел: Да се утврди улогата на вирусните хепатити Б и Ц како причинители за настанување на цироза на црниот дроб и како причинители за настанување на цироза на црниот дроб. Материјал и методи: Податоците се добиени од Клиниката за гастроентерохепатологија - Скопје, за хоспитализирани болни за периодот 1997-2003 година. Податоците се ретроспективно обработени и табеларно и графички прикажани. Резултати: Во анализираниот период хоспитализираните лица кои биле со оштетување на црниот дроб најмногу се со инфекција од вирус на хепатит Б, односно вкупно 287 болни, додека кај 70 лица причина бил вирусот на хепатит Ц. Кај 30 лица, покрај вирусната инфекција, оштетувањата биле последица и на алкохол, а кај 15 лица утврдена е инфекција и на хепатитис Б и Ц. Заклучок: Вирусните хепатити Б и Ц во голем процент преминуваат во хроничитет и предизвикуваат трајни оштетувања во функцијата на црниот дроб, па затоа навременото откривање и превенцијата претставуваат единствени мерки во намалувањето на овој сериозен медицински проблем.

358

ВИРУСНИОТ ХЕПАТИТ Ц ВО ОПШТИНА ШТИП СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА РИЗИЧНИТЕ ГРУПИ VIRAL HEPATITIS C IN THE MUNICIPALITY OF STIP WITH SPECIAL EMPHASIS ON RISK GROUPS

Srbinska A. 1, Puzderliska L. 1, Grkov V. 1, Zivkov Z. 1,
1 Завод за здравствена заштита - Штип, Република Македонија

Цел: Прикажување на состојбата на хепатит Ц во Општина Штип во периодот од 1996 до 2005 година. Препознавање и рано откривање на инфицираната популација. Методи: Користена е епидемиолошко-дескриптивната метода и истражување меѓу целните групи - затвореници и зависници од наркотични средства. Епидемиолошки пријавни карти, болнички дневници од инфективно отделение. Крвта е тестирана со Рапид-тест. Резултат: Од 1996 до 2005 година имаме пријавено само седум случаи инфицирани со ХЦВ. За сите години морбидитетот е 13,46 од кои 5 се машки лица, а 2 женски. Возраста се движи од 14 до 27 години. На инфективното отделение овие години регистрирани се 18 случаи, со симптоми на премаленост и промени во ензиматскиот статус, 14 мажи и 4 жени. Старосна група од 15 до 30 години, морбидитет 34,61. Група од 27 зависници од кои 22 лица се позитивни, а 5 негативни на ХЦВ. Морбидитет 42,3 или 81,48% од регистрираните. Испитани се 48 затвореници со земање на крв. Од нив 4 се позитивни, со општ морбидитет 7,69. Од 20 до 46 години, без симптоми. Заклучок: Бројот на инфицирани е поголем кај ризици групи. Иако ХЦВ може да се јави во сите старосни групи, најзастанена е групата од 15 до 30 години. Преовладуваат мажи. Болеста, генерално, не се препознава од јавноста, така што нивото на загриженост и тестирање е многу ниско.

359

НЕКОИ ЕПИДЕМИОЛОШКИ ПРЕМИСИ И КОНКЛУЗИИ НА ВИРУСНИОТ Б ХЕПАТИТ SOME EPIDEMIOLOGICAL HIGHLIGHTS AND CONCLUSIONS REGARDING VIRAL HEPATITIS B

Sinadinovska-Andreevska L.1, Simonovska V.1, Stojanov A.1, Andreevski V.2,

1 Завод за здравствена заштита - Скопје, 2 Клиника за гастроентерохепатологија - Скопје, Република Македонија,

Цел: Целта на овој труд е да се прикаже застапеноста на